

CALENDÁRIO VACINAL SBIIm 2023/2024

Do nascimento à terceira idade



VACINAS	DO NASCIMENTO AOS 10 ANOS DE IDADE																ADOLESCENTE		ADULTO		IDOSO	DISPONIBILIDADE DAS VACINAS					
	Ao nascer	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	24 meses	4 anos	5 anos	6 anos	9 anos	10 a 19 anos	20 a 49 anos	50 a 59 anos	A partir de 60 anos	GRATUITAS NA REDE PÚBLICA	CLÍNICAS PRIVADAS	NOS CRIEs*		
BCG ID	1 Dose	Vacinar os não vacinados anteriormente												Vacinar pessoas contactantes de hanseníase						SIM	SIM	NÃO					
Hepatite B	Três ou quatro doses a partir do nascimento								Vacinar os não vacinados anteriormente																SIM	SIM	SIM
Rotavírus	Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada (VR1 ou VR5). Iniciar vacinação antes das 15 semanas de vida.			CONTRAINDICADA																			SIM	SIM	NÃO		
Tríplice bacteriana (DTPw, DTPa ou dTpa)	Três doses (DTPa ou DTPw) iniciando aos 2 meses de idade											REFORÇO	Reforço com DTPa, DTPw ou dTpa		Reforço com dTpa a partir dos 9 anos de idade e a cada dez anos (ou, na impossibilidade de dTpa, usar dT)						SIM, DTPw e dT; dTpa para gestantes e profissionais da saúde			SIM, DTPa e dTpa	SIM, DTPa		
Haemophilus influenzae b	Três doses iniciando aos 2 meses de idade											REFORÇO	Vacinar os não vacinados anteriormente		Vacinar pessoas em situações especiais de risco						SIM, três primeiras doses			SIM	SIM		
Poliomielite (vírus inativados)	Três doses iniciando aos 2 meses de idade											REFORÇO	REFORÇO		Vacinar pessoas em situações especiais de risco						SIM, três primeiras doses			SIM	SIM		
Pneumocócicas conjugadas	Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada VPC10, VPC13 ou VPC15, iniciando aos 2 meses de idade											REFORÇO	VPC10, VPC13 ou VPC15 – Vacinar os não vacinados anteriormente		VPC13 ou VPC15: vacinar pessoas em situações especiais de risco				VPC13 ou VPC15: uma dose		SIM, VPC10, menores de 5 anos			SIM	SIM, VPC10 e VPC13		
Meningocócicas conjugadas	Duas doses iniciando aos 3 meses de idade											REFORÇO	REFORÇO		Reforço aos 11 anos. Para os não vacinados anteriormente: duas doses, com intervalo de cinco anos		Vacinar pessoas em situações especiais de risco				SIM, menC para menores de 5 anos e menACWY para 11 a 12 anos			SIM	SIM, menC e menACWY		
Meningocócica B	Duas doses iniciando aos 3 meses de idade											REFORÇO	Para os não vacinados anteriormente – Duas ou três doses de acordo com a faixa etária e a vacina utilizada						Vacinar pessoas em situações especiais de risco				NÃO	SIM	NÃO		
Poliomielite oral (vírus vivos atenuados)	CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINAÇÃO																			SIM	NÃO	NÃO					
Influenza (gripe)	VACINAÇÃO ANUAL																SIM, Trivalente menores de 5 anos e maiores de 60 anos			SIM, Tri ou Tetravalente e HD4V (60 anos ou +)			SIM, Trivalente				
Febre amarela	Duas doses: aos 9 meses de vida e aos 4 anos de idade. / Recomendação do PNI: se recebeu a primeira dose antes dos 5 anos, indicada uma segunda dose, independentemente da idade atual. Se aplicada a partir dos 5 anos: dose única. / Recomendação da SBIIm: Duas doses. Como há possibilidade de falha vacinal mesmo para quem receber a primeira dose a partir dos 5 anos, a SBIIm recomenda uma segunda dose dez anos após. / Essa vacina pode ser exigida para emissão do CIMP, atendendo exigências sanitárias de alguns destinos internacionais. Neste caso, deve ser aplicada até dez dias antes de viajar.																SIM			SIM			NÃO				
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)	Duas doses a partir dos 12 meses											Vacinar os não vacinados anteriormente						Vacinar pessoas em situações especiais de risco				SIM, até 59 anos			SIM	NÃO	
Varicela (catapora)	Duas doses a partir dos 12 meses											Vacinar os suscetíveis não vacinados anteriormente						Vacinar pessoas em situações especiais de risco				SIM			SIM	SIM	
Hepatite A	Duas doses a partir dos 12 meses											Vacinar os não vacinados anteriormente						Vacinar pessoas em situações especiais de risco				SIM, uma dose para menores de 5 anos			SIM	SIM	
HPV												Duas doses para meninas e meninos		Vacinar os não vacinados anteriormente. Para menores de 15 anos: duas doses. De 15 anos em diante: três doses.				Vacinar não vacinados e pessoas em situações especiais de risco, a critério médico (três doses)				SIM, HPV4 duas doses para meninas e meninos de 9 a 14 anos.			SIM, HPV4 e HPV9	SIM, HPV4 três doses para homens e mulheres até 45 anos pertencentes a grupos especiais	
Pneumocócica 23 valente	Vacinar pessoas em situações especiais de risco																Duas doses com intervalo de cinco anos				NÃO			SIM	SIM		
Herpes zóster	A partir dos 18 anos, vacinar pessoas em situações especiais de risco																Rotina a partir dos 50 anos				NÃO			SIM	NÃO		
Dengue	Qdenga® recomendada entre 4 e 60 anos independente de contato prévio com o vírus da dengue, duas doses com intervalo de três meses entre elas. Dengvaxia® recomendada entre 6 e 45 anos, somente para soropositivos para dengue, três doses com intervalo de seis meses entre elas.																NÃO			SIM			NÃO				
Covid-19	Acesse os dados atualizados sobre a disponibilidade de vacinas e os grupos contemplados pelo PNI em: sbim.org.br/covid-19																										

21/08/2023 • Orientações, esquemas de doses e comentários devem ser consultados nos *Calendários de vacinação SBIIm 2021/2022* e nos *Calendários de vacinação SBIIm pacientes especiais*.
 * Consultar manual do CRIE em https://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_centros_imunobiologicos_especiais_5ed.pdf (acesso em 01.09.2022). Para pacientes com determinadas doenças crônicas e sob orientação médica, consultar os *Calendários de vacinação SBIIm pacientes especiais*.

